

WICHTIG - PATIENTENPASS
Abacavir/Lamivudin AmaroX (Abacavir/Lamivudin)
Filmtabletten
Tragen Sie diese Karte immer bei sich

Da Abacavir/Lamivudin AmaroX Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin AmaroX einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese kann **lebensbedrohlich** werden, wenn Abacavir/Lamivudine AmaroX weiterhin eingenommen wird. **SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin AmaroX absetzen müssen, wenn:

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
- 2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin AmaroX aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin AmaroX oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z. B. Abacavir, Abacavir/Lamivudin/Zidovudin oder Abacavir/Dolutegravir/Lamivudine) ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

(siehe Rückseite dieser Karte)

Rückseite

WICHTIG - PATIENTENPASS
Abacavir/Lamivudin AmaroX (Abacavir/Lamivudin)
Filmtabletten
Tragen Sie diese Karte immer bei sich

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin AmaroX entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt:

Tel:

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).