

PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG Rivaroxaban		Ich stehe unter einer blutgerinnungshemmenden Behandlung mit Rivaroxaban:		Bitte verständigen Sie im Notfall:		Bitte verständigen Sie auch:	
☐ Rivaroxaban 2,5 mg	☐ Rivaroxaban 15 mg	Name		Name des Arztes		Name	
☐ Rivaroxaban 10 mg	☐ Rivaroxaban 20 mg	Anschrift		Telefonnummer des Arztes		Telefonnummer	
• Tragen Sie diesen Ausweis ständig bei sich • Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt oder Zahnarzt vor der Behandlung		Geburtsdatum		Arztstempel		Beziehung	
		Gewicht				DRUGS/API/50/2009	
		Andere Medikamente / Erkrankungen				Rivaroxaban-V01-Patientenausweis 2087121	
42.5 mm		42.5 mm		42.5 mm		41.5 mm	
254 mm							

The diagram shows a long rectangular box with a total length of 254 mm. The box is divided into six sections by vertical lines. The dimensions of the sections are: 41.5 mm, 42.5 mm, 42.5 mm, 42.5 mm, 42.5 mm, and 42.5 mm. The height of the box is 53 mm. The first section (41.5 mm) is light blue and contains information for doctors and pharmacists. The second section (42.5 mm) is light blue and contains information about what the patient should know. The third section (42.5 mm) is light blue and contains information about when to ask the doctor or pharmacist for advice. The fourth section (42.5 mm) is light blue and contains information about how to take the medication. The fifth section (42.5 mm) is light blue and contains information about the side effects. The sixth section (42.5 mm) is light blue and contains information about the storage conditions.

Section	Dimensions	Content
1	41.5 mm	Information für den Arzt oder Apotheker: Die INR ist zur Bestimmung der antikoagulatorischen Wirkung von Rivaroxaban nicht aussagekräftig und sollte deshalb nicht angewendet werden.
2	42.5 mm	Was sollte ich über Rivaroxaban wissen? - Rivaroxaban verdünnt das Blut und schützt Sie so vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel. - Rivaroxaban muss genau nach Anleitung Ihres Arztes eingenommen werden. Um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten, lassen Sie niemals eine Dosis aus. - Sie dürfen Rivaroxaban nicht absetzen, ohne vorher mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben, da sich das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln bei Ihnen erhöhen könnte.
3	42.5 mm	Wann sollte ich meinen Arzt oder Apotheker um Rat fragen? Bei der Einnahme eines Blutgerinnungshemmers wie Rivaroxaban ist es wichtig, mit den möglichen Nebenwirkungen vertraut zu sein. Eine Blutung ist die am häufigsten auftretende Nebenwirkung. Beginnen Sie nicht mit der Einnahme von Rivaroxaban, wenn Sie wissen, dass bei Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt darüber. Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen: - Schmerzen - Schwellung oder Unwohlsein - Kopfschmerzen, Schwindel oder Schäche
4	42.5 mm	Wie nehme ich Rivaroxaban ein? - Für einen optimalen Schutz - kann Rivaroxaban 2,5 mg unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden - kann Rivaroxaban 10 mg unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden - muss Rivaroxaban 15 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden - muss Rivaroxaban 20 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden
5	42.5 mm	- Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, lang anhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden - Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich - Blut in Ihrem Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann, rot oder schwarz gefärbter Stuhl - Abhusten von Blut oder blutiges bzw. kaffeefarbiges Erbrechen
6	42.5 mm	

Artwork information			
Customer	Amarox	Market	DE
Dimensions (mm)	254 x 53 mm	Pharmacode	718
Printing Colours	 PANTONE 7685 C		
Non Printing Colors	 Die cut  Unvarnish Area  Perforation		
Version: 00		Supersede: 2085030	

